

NOTFALLAUSWEIS – EMERGENCY CARD

CARTE D'URGENCE – CARTA DE EMERGENCIA –
CARTÃO DE EMERGÊNCIA

Bitte behandeln Sie diesen Patienten sofort!

Immediate care required!

Besoin d'un traitement immédiat!

El paciente requiere tratamiento inmediato!

Precisar de assistência médica imediata!

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

Telefon:

NOTRUF 112

Emergency call – Appel d'urgence – Llamada de emergencia –
Número de emergência

Sichelzellkrankheit und Asplenie

Sickle Cell Disease and Asplenia

Drépanocytose et Asplénie

Anemia falciforme e Asplenia

Anemia falciforme e Asplenia

Es besteht ein besonderes Risiko für:

- lebensbedrohliche bakterielle Infektionen
- lebensbedrohliche Exazerbationen der Anämie, zum Beispiel durch
 - Milzsequestrationen (Symptomatik einer inneren Blutung)
 - aplastische Krisen während bestimmter Virusinfektionen
 - akute Hämolysen
- Schlaganfälle (auch im Kindesalter)
- akute Thoraxsyndrome (klinische Symptomatik einer Pneumonie/ respiratorischen Insuffizienz)
- stärkste Schmerzen
- und andere, seltenere Komplikationen

Bitte bagatellisieren Sie niemals Fieber über 38,5°C und die Angabe von Schmerzen!

In die Behandlung dieses Patienten sollte – wann immer möglich – ein Hämatologe einbezogen werden.

Notfall-Literatur:

www.sichelzellkrankheit.info

www.awmf.org/leitlinien/detail/II/025-016.html

www.asplenie-net.org

www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report.pdf

Notfallantibiotikatherapie – Optionen

(Erhöhtes Infektionsrisiko für Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus influenzae, Salmonellen und andere Keime)

Bei Kindern:

p.o. Cefixim 8 mg/kgKG in 2 ED

i.v. Cefotaxim 100 mg/kgKG in 3 ED

Bei Erwachsenen:

p.o. Cefixim 400 mg in 2 ED

i.v. Cefotaxim 6-12 g in 3 ED

Behandelnde Klinik:

Notfall-Kontakt:



GPOH-KONSORTIUM
SICHELZELLKRANKHEIT

weitere Kontakte: www.sichelzellkrankheit.info